

CONDUITA DUPĂ O ANESTEZIE LA NIVELUL PLEXULUI BRAHIAL

Pentru propria dvs. siguranță, vă rugăm ca timp de 24 de ore să respectați următoarele reguli:

- În ziua operației, trebuie să vă odihniți cât de mult posibil.
- Rugați un adult să vină să vă ia cu mașina, nu conduceți sub nicio formă dvs. înșivă un vehicul, nu participați fără un însoțitor la traficul rutier.
- Asigurați și pentru acasă asistență
- Acasă, trebuie să vă menajați corpul.
- Nu lucrați la sau cu utilaje periculoase

Important: În caz de probleme precum dureri puternice care nu pot fi remediate cu analgezicele recomandate, greață persistentă, vomă, febră (peste 38 °C) sau probleme respiratorii, trebuie să consultați imediat un medic sau să solicitați ambulanța noastră.

CONDUITA DUPĂ O ANESTEZIE LA NIVELUL PLEXULUI BRAHIAL

În cele din urmă, dorim să indicăm faptul că în cazul celor de mai sus este vorba de recomandări generale. În eventualitatea în care din istoricul personal de boală rezultă alte recomandări personalizate, acestea au fost discutate cu dvs. în cadrul discuției de externare.

Vă dorim însănătoșire grabnică!

Echipa dvs. curantă




CASETĂ TEHNICĂ

Titular suport media: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR · Locul publicării: 3100 St. Pölten · Credite imagini: iStock

Versiunea 06/2021

Informatie externare

Conduita după o anestezie la nivelul plexului brahial



G

A

CONDUITA DUPĂ O ANESTEZIE LA NIVELUL PLEXULUI BRAHIAL


Stimată pacientă,
stimate pacient,

aceste recomandări se adresează pacienților care au primit o anestezie la nivelul plexului brahial.

În timpul anesteziei la nivelul plexului brahial, cordonul nervos al plexului nervos brahial (Plexus brachialis) este amorțit în mod țintit. Plexul nervos brahial cuprinde nervii care pornesc de la coloana vertebrală cervicală, de sub claviculă, trec peste prima coastă și se întind până în axilă, și servește întregului braț, până în vârful degetelor. Acesta poate fi blocat în diferite locuri, prin injectarea unui anesthetic.

Zona în cauză devine caldă și fără senzații, perceperea durerii este oprită și brațul nu poate fi mișcat sau poate fi mișcat doar în mod restricționat timp de câteva ore.

CONDUITA DUPĂ O ANESTEZIE LA NIVELUL PLEXULUI BRAHIAL



Anestezia la nivelul plexului este foarte adecvată pentru intervenții în zona brațului, a antebrațului, a încheieturii mâinii și a degetelor (de ex., în cazul sindromului de tunel carpian, al degetului în resort etc.).

Complicații posibile

În cazuri rare, din cauza acului injectăției, în locul înțepăturii poate să apară un mic hematom, care dispare în decurs de câteva zile.

Leziunile nervoase și infecțiile locale ca urmare a înțepăturii cu acul sunt extrem de rare. Ocazional, lezările nervilor cutanați pot duce la parestezii temporare.

CONDUITA DUPĂ O ANESTEZIE LA NIVELUL PLEXULUI BRAHIAL

Reguli de siguranță după intervențiile în regim ambulatoriu

Multe operații se efectuează în prezent în regim ambulatoriu. Acest lucru înseamnă că sunteți sub îngrijirea noastră doar timp de câteva ore și că sunteți externat chiar în ziua operației. Întrucât o anestezie la nivelul plexului poate să persiste timp de câteva ore și, astfel, perceperea durerii și controlul asupra mișcării brațului este redus până la anulat, există un risc sporit de rănire a părții anesteziate a corpului.

- Din acest motiv, **evitați** contactul cu obiecte **fierbinți**, ascuțite și cu margini tăioase.
- **Bandajul triunghiular** aplicat servește **protecției** dvs. și trebuie purtat **doar în ziua operației, peste zi.**
- Vă rugăm să **protejați** după o anestezie la nivelul plexului **zone încă amorțite ale corpului** împotriva **efectelor exterioare** (de ex., căldură puternică, frig, presiune).
- **Efectele ulterioare ale medicamentelor și anesteziei** pot să influențeze **temporar capacitatea dvs. de reacție.**