

## Îngrijirea corpului

- După vindecarea plăgii apărute în urma operației, sunt posibile dușurile și băile; până atunci, faceți duș cu un plasture pentru duș
- Evitați pe cât posibil să utilizați săpun în zona Port-a-Cath
- Dacă acul este întins, faceți duș cu plasture pentru duș, nu faceți baie
- După scoaterea acului, faceți duș sau baie cel mai devreme după patru ore

## Riscuri

Riscul aplicării și manevrării unui sistem Port-a-Cath este foarte mic. Cu toate acestea, în cazuri rare, se poate ajunge la complicații care trebuie tratate medical imediat!

**Unele complicații pot să apară și mult mai târziu după introducerea Port-a-Cath!**

Complicațiile posibile sunt, de ex.:

- Leziunile nervoase
- Sângerările și echimozele (hematoamele)
- Pneumotorax (aerul ajunge în fanta dintre plămân și pleură)
- Cheaguri de sânge
- Tulburări de ritm cardiac
- Dureri
- Infecții
- Alunecarea Port-a-Cath
- Ocluzia Port-a-Cath

Informați întotdeauna personalul din instituttele de sănătate cu privire la faptul că aveți un Port-a-Cath și aduceți cu dvs. pașaportul de purtător de Port-a-Cath la toate examinările.

**Important: în cazul semnelor de infecție precum umflăturile, înroșirile, durerile în jurul Port-a-Cath, dispnee sau durere înțepătoare în piept, precum și febră peste 38 °C sau sângerări, adresați-vă neîntârziat medicului dvs. curant!**

În cele din urmă, dorim să indicăm faptul că în cazul celor de mai sus este vorba de recomandări generale. În eventualitatea în care din istoricul personal de boală rezultă alte recomandări personalizate, acestea au fost discutate cu dvs. în cadrul discuției de externare.

*Vă dorim însănătoșire grabnică!*

**Echipa dvs. curantă**



CASETĂ TEHNICĂ  
Titular suport media: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR • Locul publicării: 3100 St. Pölten • Credite imagini: Landeskrankenhaus Baden-Mödling

Versiunea 06/2022

*Informație pentru pacienți și rude*

despre manevrarea  
unui Port-a-Cath venos



L  
G  
A

## INFORMAȚII DESPRE MANEVRAREA UNUI PORT-A-CATH VENOS

Stimată pacientă,  
Stimate pacient,  
Stimate rude,

pentru dvs. sau pentru ruda dvs. se introduce sau s-a introdus un Port-a-Cath venos (numit și port-cateter sau port-sistem). Un Port-a-Cath este un sistem de cateter introdus sub piele. Acesta poate fi introdus sub clavicula stângă sau dreaptă. Introducerea are loc în timpul unei mici operații, de cele mai multe ori sub anestezie locală. Dacă se dorește, în plus față de anestezia locală, se poate administra un somnifer, care are și efect de eliminare a anxietății și de liniștire. Un Port-a-Cath se introduce în tratamentul bolilor pentru care este necesar un acces frecvent și sigur la sistemul circulator.

Sistemul este format din trei piese:

1. Portal: o cameră mică, sigilată cu o membrană din silicon
2. Cateter: un furtun subțire, flexibil, care se introduce de cele mai multe ori într-un vas de sânge (venă) din apropierea inimii
3. Conector: îmbinare între cameră și furtun

Port-a-Cath stă întins sub piele. Doar o mică ridicătură (a se vedea imaginea de copertă) este vizibilă.

## INFORMAȚII DESPRE MANEVRAREA UNUI PORT-A-CATH VENOS

### Utilizare și avantaje

Printre altele, Port-a-Cath face posibilă administrarea menajantă a perfuziilor, medicamentelor, transfuziilor de sânge și prelevările de sânge. Astfel, nu trebuie să fie înțepată de fiecare dată de ex. îndoitura cotului pentru a avea acces la vasele de sânge. Pericolul de infecție se reduce, apar mai puține dureri. Și riscul ca medicamentele să ajungă în țesut în loc de sistemul circulator (scurgere) este mult mai mic.

Port-a-Cath permite o mobilitate înaltă în perioada fără terapie.

### Durata de utilizare

Medicul curant discută cu dvs. situația personală. Acesta vă informează cu privire la durata de utilizare a Port-a-Cath planificată. În principiu, Port-a-Cath poate să rămână sub piele timp de mai mulți ani.

Atunci când Port-a-Cath nu este utilizat mai mult timp, acesta trebuie clătit regulat de personalul medical instruit. Distanța dintre clătiri va fi stabilită de medicul dvs. Printre altele, clătirile sunt necesare pentru a preveni infecțiile și cheagurile de sânge.

## INFORMAȚII DESPRE MANEVRAREA UNUI PORT-A-CATH VENOS

### Restricții

În primele zile după introducerea, trebuie să se evite efortul fizic. De îndată ce plaga apărută în urma operației este vindecată, se pot relua activități precum alergatul, schiatul, înotul etc. Atunci când este utilizat sau introdus, trebuie să se evite mișcările extreme în zona Port-a-Cath (de ex., golf, ridicare de greutate etc.).

Discutați cu medicul dvs. curant despre obiceiurile dvs., îndeosebi dacă practicați un sport de performanță.

Informați personalul din institutele de sănătate cu privire la faptul că aveți un Port-a-Cath. În orice caz, înainte de efectuarea unei proceduri de imagistică precum IRM (imagistică prin rezonanță magnetică).

### Indicații generale

De ex., pentru administrarea perfuziilor, după curățarea și dezinfectarea în prealabil, se introduce un ac prin pielea dvs. în portalul Port-a-Cath. Acul poate fi lăsat acolo mai multe zile sau poate fi scos imediat după tratament. Acest lucru îl veți decide împreună cu medicul dvs. Acele rămase în portal trebuie înlocuite cel puțin o dată la două săptămâni.

## INFORMAȚII DESPRE MANEVRAREA UNUI PORT-A-CATH VENOS

Nu îndoiiți sau scuturați acele.

În timpul tratamentului:

- În caz de probleme, sunați la personalul medical, de ex. dacă perfuzia nu mai curge
- Sistemul trebuie clătit întotdeauna după utilizare. De aceasta se ocupă personalul medical!

### Detectoare de metal

Detectoarele de metal, de ex. cele de la controlul de securitate din aeroport, nu dăunează sistemului Port-a-Cath. De cele mai multe ori, nu se declanșează nicio alarmă.

Luați întotdeauna la dvs. pașaportul de purtător de Port-a-Cath! Pașaportul îl primiți în spital după introducerea Port-a-Cath.