

Examinări de control

La aprox. 3 luni după operație, trebuie efectuat un control cu ultrasunete. Pe mai departe, recomandăm controale anuale ale evoluției la medicul de specialitate stabilit pentru radiologie.

Important: în cazul apariției febrei (peste 38 °C), al umflăturilor, durerilor și înroșirilor în zona plăgii, trebuie să consultați imediat un medic sau departamentul nostru de îngrijire ambulatorie.

În cele din urmă, dorim să indicăm faptul că în cazul celor de mai sus este vorba de recomandări generale. În eventualitatea în care din istoricul personal de boală rezultă alte recomandări personalizate, acestea au fost discutate cu dvs. în cadrul discuției de externare.

Vă dorim însănătoșire grabnică!

Echipa dvs. curantă




CASETĂ TEHNICĂ

Titular suport media: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR • Locul publicării: 3100 St. Pölten • Credite imagini: Philipp Monihart, iStock

Versiunea 06/2021

Informație externare

Conduita după o operație la artera carotidă



G

A

CONDUITA DUPĂ O OPERAȚIE LA ARTERA CAROTIDĂ

Stimată pacientă,
Stimate pacient,

Ca o completare la discuția noastră de externare și scrisoarea medicală, dorim să vă oferim alte câteva recomandări generale pentru perioada de după șederea dvs. în departamentul nostru.

Dureri la nivelul plăgii

Pot să apară dureri în zona plăgii apărute în urma operației, în mod normal acestea se remit în decurs de o săptămână.

Dacă durerile există în continuare sau reapar, vă rugăm să vă adresați medicului dvs. de familie sau departamentului nostru de îngrijire ambulatorie.

Îngrijirea plăgii

În principiu, plaga nu necesită nicio îngrijire specială a cicatricei. Însă, pentru optimizarea procesului de vindecare, se poate aplica regulat o cremă de îngrijire a pielii.

CONDUITA DUPĂ O OPERAȚIE LA ARTERA CAROTIDĂ

Îngrijirea corpului

Dușurile sunt posibile oricând începând cu a 2-a zi după operație, însă regiunea plăgii trebuie curățată numai cu apă fără săpun. Vă rugăm să discutați cu medicul dvs. curant cu privire la utilizarea unui plasture pentru duș. Băile complete trebuie efectuate cel mai devreme la 2 săptămâni după scoaterea firelor.

Băile de soare și bronzarea la solar în zona plăgii apărute în urma operației trebuie efectuate abia la 6 luni după operație. În cazul unei băi de soare timpurii, plaga trebuie acoperită cu un prosop.

Solicitare fizică/capacitate de muncă

Recomandăm menajare corporală timp de 2 săptămâni după operație, precum și evitarea solicitării fizice puternice timp de 4 săptămâni după operație. La finalul acestora, este permisă solicitarea completă.

La 2 săptămâni după operație, sunt permise toate tipurile de sport, cu excepția solicitării fizice puternice.

CONDUITA DUPĂ O OPERAȚIE LA ARTERA CAROTIDĂ

Capacitatea de muncă diferă de la persoană la persoană și depinde de activitatea profesională. În principiu, sunteți apt de muncă la 2-3 săptămâni după operație.

Administrarea de medicamente

Pentru îmbunătățirea circulației sangvine, după operație vi se prescriu inhibitori ai agregării trombocitelor precum Thrombo Ass®, Aspirin®, Plavix® etc. Vă rugăm să luați medicamentul zilnic și pe termen nedefinit.

Excepții de la această prescripție sunt pacienții care iau deja un alt medicament anticoagulant (de ex., Marcoumar®, Sintrom®).

