

CONDUITA DUPĂ UN BIPGUN
(ȚESUT PROSTATIC)

În cele din urmă, dorim să indicăm faptul că în cazul celor de mai sus este vorba de recomandări generale. În eventualitatea în care din istoricul personal de boală rezultă alte recomandări personalizate, acestea au fost discutate cu dvs. în cadrul discuției de externare.

Vă dorim însănătoșire grabnică!

Echipa dvs. curantă



CASETĂ TEHNICĂ

Titular suport media: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR • Locul publicării: 3100 St. Pölten • Credite imagini: iStock

Versiunea 06/2021

Informație externare

Conduita după un Bipgun Țesut prostatic



G

A

**CONDUITA DUPĂ UN BIPGUN
(ȚESUT PROSTATIC)**

Stimate pacient,

vi s-a efectuat o prelevare de țesut prostatic.

Pentru a influența favorabil intervenția și pentru a evita pe cât posibil complicațiile, începând din ziua externării și timp de 10 zile după trebuie să respectați următoarele.

- beți lichide din abundență
- puteți mânca și bea de toate (hrană normală)
- evitați presarea în timpul defecării (scaunul trebuie să fie moale)
- menajare corporală, nu ridicați mai mult de 5 kg, fără activități sau tipuri de sport care pot mări presiunea în abdomenul inferior, fără lucru în grădină timp de 10 zile
- fără saună, băi complete, vizite la piscină timp de 10 zile
- control la medicul de specialitate după 10-14 zile, pentru a discuta despre rezultatele investigațiilor medicale histologice

**CONDUITA DUPĂ UN BIPGUN
(ȚESUT PROSTATIC)**

Generalități

- În următoarele 4-6 săptămâni, pot apărea mici cantități de sânge în urină, scaun și spermă. Acest lucru este complet normal și fără probleme.
- În caz de retenție urinară sau urinare îngreunată: în urma prelevării de probe, se poate ajunge la o umflare a prostatei, ceea ce îngreunează urinarea. Luați în continuare medicamentele dvs. precum Tamsu, Alna etc.; eventual, mergeți la medicul dvs. urolog sau la departamentul de îngrijire ambulatorie urologică.
- Se poate ajunge la febră și/sau frisoane în ciuda terapiei în curs cu antibiotice. În acest caz, este vorba de o infecție a prostatei; vă rugăm să consultați medicul dvs. urolog sau departamentul de îngrijire ambulatorie urologică.

Important: în cazul apariției febrei, sângerărilor masive sau problemelor la urinare, trebuie să consultați imediat un medic de specialitate sau un departament de îngrijire urologică ambulatorie!