

Kontrol muayeneleri

Ameliyattan yaklaşık 3 ay sonra bir ultrason kontrolü yapılmalıdır. Daha sonra, özel muayenehanede uzman bir radyolog tarafından yıllık takip muayeneleri yapılmasını öneriyoruz.

Önemli: Ateşiniz varsa (38 °C'nin üzerinde), yarada şişlik, ağrı ve kızarıklık varsa derhal bir doktora veya poliklinik bölümümüze başvurmalısınız.


Ayrıca, buradaki ifadelerin genel tavsiyeler olduğunu belirtmek isteriz. Size özel başka tavsiyelerde bulunulmasını gerektiren bir tıbbi geçmişe sahipseniz, bunlar taburcu görüşmesi sırasında size iletilmiş olacaktır.

Size sağlıklı bir iyileşme dönemi diliyoruz!

Tedavi ekibiniz

Taburcu bilgileri

Karotis arter (carotis) cerrahisi sonrasındaki davranışlar



BASKI BİLGİLERİ

Medya sahibi: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR • Yayımlanma yeri:
3100 St. Pölten • Fotoğrafın kaynağı: Philipp Monihart, iStock

Versiyon 06/2021

G

A

KAROTİS ARTER (CAROTIS) CERRAHİSİ SONRASINDAKİ DAVRANIŞLAR

Sayın hasta,

Taburcu görüşmemize ve doktor raporuna ek olarak, yatışınızdan sonraki dönem için size bazı genel tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.

Yara ağrısı

Yara bölgesinde ağrı oluşabilir, normalde bir hafta içinde bu ağrının hafiflemesi beklenir.

Ağrı devam ederse veya tekrarlırsa, lütfen aile hekiminize veya polikliniğimize başvurun.

Yara bakımı

Prensip olarak, yara herhangi bir özel yara bakımı gerektirmez. Bununla birlikte, iyileşme sürecini hızlandırmak için düzenli olarak bir cilt bakım kremi kullanılabilir.

KAROTİS ARTER (CAROTIS) CERRAHİSİ SONRASINDAKİ DAVRANIŞLAR

Vücut bakımı

Ameliyattan sonraki 2. günden itibaren duş almak mümkündür, ancak yara bölgesi sadece su ile, sabun olmadan temizlenmelidir. Lütfen duş bandajı kullanımı hususunu tedaviyi yürüten doktorunuzla görüşün. Dikiş alındıktan sonra tam anlamıyla banyo yapılmak için en az 2 hafta beklenmelidir.

Ameliyattan 6 ay sonrasına kadar cerrahi yara bölgesi güneş banyosuna ve solaryuma maruz kalmamalıdır. Erken dönemde güneşe maruz kalınması durumunda yara bir bezle örtülmelidir.

Fiziksel zorlanma/çalışmaya uygunluk

Ameliyattan sonra 2 hafta boyunca fiziksel istirahat ve 4 hafta boyunca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını öneriyoruz. Bunun ardından tam yük altına girmeye izin verilir.

Ameliyattan 2 hafta sonra, ağır fiziksel aktiviteler dışında her türlü spora izin verilir.

KAROTİS ARTER (CAROTIS) CERRAHİSİ SONRASINDAKİ DAVRANIŞLAR

Çalışmaya uygunluk kişiden kişiye değişir ve mesleki faaliyete bağlıdır. Prensip olarak, ameliyattan 2-3 hafta sonra hasta çalışabilir.

İlaç kullanımı

Kan dolaşımı durumunu iyileştirmek için, ameliyattan sonra size Thrombo Ass®, Aspirin®, Plavix® gibi trombosit toplanma inhibitörleri reçete edilecektir. Lütfen bu ilacı süresiz olarak her gün alınız.

Halihazırda başka bir kan pıhtılaşması önleyici ilaç (örn. Marcoumar®, Sintrom®) kullanan hastalar bu reçete kapsamı dışındadır.

