

AYAK PARMAĞI VE AYAĞIN ÖN TARAFININ AMPUTASYONLARINDAN SONRAKİ DAVRANIŞLAR



Önemli: Ateş (38 °C'nin üzerinde), yarada şişlik, ağrı veya kızarıklık varsa derhal bir doktora veya poliklinik bölümümüze başvurmalısınız.

AYAK PARMAĞI VE AYAĞIN ÖN TARAFININ AMPUTASYONLARINDAN SONRAKİ DAVRANIŞLAR

Ayrıca, buradaki ifadelerin genel tavsiyeler olduğunu belirtmek isteriz. Size özel başka tavsiyelerde bulunulmasını gerektiren bir tıbbi geçmişe sahipseniz, bunlar taburcu görüşmesi sırasında size iletilmiş olacaktır.

Size sağlıklı bir iyileşme dönemi diliyoruz!

Tedavi ekibiniz



BASKI BİLGİLERİ

Medya sahibi: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR • Yayımlanma yeri: 3100 St. Pölten • Fotoğrafın kaynağı: Philipp Monihart, iStock

Versiyon 06/2021

Taburcu bilgileri

Ayak parmağı ve ayağın ön tarafının amputasyonlarından sonraki davranışlar



L
G

A

AYAK PARMAĞI VE AYAĞIN ÖN TARAFININ AMPUTASYONLARINDAN SONRAKİ DAVRANIŞLAR

Sayın hasta,

Taburcu görüşmemize ve doktor raporuna ek olarak, yatışınızdan sonraki dönem için size bazı genel tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.

Yara ağrısı

Yara bölgesinde ağrı oluşabilir, normalde bir hafta içinde bu ağrının hafiflemesi beklenir.

Ağrı devam ederse veya tekrarlırsa, lütfen aile hekiminize veya polikliniğimize başvurun.

Hayalet uzuv ağrısı

Hayalet uzuv ağrısı ilaç tedavisi ile başarılı bir şekilde ortadan kaldırılabılır.

AYAK PARMAĞI VE AYAĞIN ÖN TARAFININ AMPUTASYONLARINDAN SONRAKİ DAVRANIŞLAR

Yara bakımı

Sık aralıklarla bandaj değişimi yapılması, bandajın temiz tutulması ve uygun ayakkabı giyilmesi (yara iyileşmesi sırasında bandaj için ayakkabı giyilmesi veya yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra ortopedik ayakkabı tercih edilmesi) hızlı yara iyileşmesinin sağlanmasında temel faktörlerdir.

Fiziksel zorlanma/çalışmaya uygunluk

Ameliyat edilen bacağı ağırlık bindirilmesine temelde izin verilir, ancak bu ağırlık mümkün olduğunca düşük seviyede tutulmalıdır.

Çalışmaya uygunluk kişiden kişiye değişir ve mesleki faaliyete bağlıdır. Lütfen bu konuda tedaviyi yürüten doktorunuza danışın.

Vücut bakımı

Duş almak, bölgenin durumuna bağlı olarak ameliyattan sonraki 5 ila 10 gün sonra mümkün olacaktır. Lütfen duş bandajı kullanımı hususunu tedaviyi yürüten doktorunuzla görüşün.

AYAK PARMAĞI VE AYAĞIN ÖN TARAFININ AMPUTASYONLARINDAN SONRAKİ DAVRANIŞLAR

Kontrol muayeneleri

Gerekli kontroller, klinik tabloya ve iyileşme sürecine bağlı olarak kişiden kişiye değişir ve taburcu olduğunuzda tedaviyi yürüten doktorunuz tarafından size bildirilecektir. Lütfen poliklinik kontrol randevularına kendi çıkarlarınız doğrultusunda riayet ediniz

