


**U slučaju vrućice (preko 38 °C), oticanja, bolova i crvenila na rani, odnosno bolova u trbuhi popraćenim tegobama pri obavljanju nužde (zatvor, proljev), odmah se обратите ljekaru/ki ili posjetite našu ambulantu.**

**Nadamo se da smo ovom informacijom odgovorili na Vaša moguća pitanja te Vam želimo brz oporavak!**

Vaš hirurški tim

## Hirurgija

### Informacije o otpustu iz bolnice



### Savjeti za oporavak poslije endoskopskog odstranjivanja žučnjaka

#### Impresum:

Izdavač: NÖ Landesgesundheitsagentur  
Verzija 05/2015  
Galle

[www.lknoe.at](http://www.lknoe.at)

## Savjeti za oporavak poslije endoskopskog odstranjivanja žučnjaka

**Poštovana pacijentice!**

**Poštovani pacijente!**

Dodatno uz naš razgovor o otpustu iz bolnice i lječarski nalaz želimo Vam ponuditi još nekoliko informacija koje će Vam poslužiti poslije boravka na našem odjeljenju.

Kako biste i Vi najbolje utjecali na proces oporavka, pridržavajte se sljedećeg:

Izbjegavajte fizičko opterećenje	2-4 sedmice
Nedopušteno je dizanje i nošenje tereta (maks. 3-5 kg)	2-4 sedmice
Bavljenje sportom, potpuno fizičko opterećenje poslije	2-4 sedmice
Odstranjivanje šavova, odnosno kopči ili steristripa	zavisno od lječarске upute 7-10 dana poslije operacije
Kod samoraspadajućih šavova samostalno odstranjanje flastera	oko 1 sedmice poslije operacije

## Savjeti za oporavak poslije endoskopskog odstranjivanja žučnjaka

### Važne opšte informacije

#### Prehrana

U prve 2 do 4 sedmice poslije operacije preporučujemo Vam lagano hranu. Poslije toga možete uglavnom jesti i piti što poželite i što Vam odgovara.

No za početak ograničite jako masna jela na manje porcije, kako bi se Vaše tijelo povremeno prilagodilo na novu situaciju.

#### Bolovi na rani

Mogu nastati bolovi u području rane od operacije, no u većini slučajeva oni nestaju u roku od jedne sedmice.

U prvoj sedmici poslije operacije može doći do lagano naduvanog trbuha uz probadajući bol koja se širi do ramena uzrokovanim operacijskom tehnikom tokom koje se koristio plin.

## Savjeti za oporavak poslije endoskopskog odstranjivanja žučnjaka

#### Tjelesna higijena

Smijete se tuširati 2 dana poslije operacije, no područje oko rane čistite samo vodom, bez sapuna. O korištenju vodonepropusnih flastera porazgovarajte sa svojim nadležnim lječarom/kom. Kupanje u punoj kadi možete vršiti najranije jednu sedmicu poslije odstranjenja šavova.

Iako u pravilu nije potrebna posebna njega rane, redovno korištenje krema za njegu kože može poboljšati proces iscjeljivanja.