

Savjeti za oporavak poslije operacije radi

Dupuytrenove kontrakture

Savjeti za oporavak poslije operacije radi

Dupuytrenove kontrakture

**U slučaju da se pojave tegobe (bolovi, promjena boje kože u području prstiju, poremećaj osjetljivosti), posjetite lje-kara/ku ili našu ambulantu!**

Nadamo se da smo Vam ovom informacijom bili od pomoći te Vam rado stojimo na raspolaganju, ako imate još kakvih pitanja.

**Želimo Vam brz oporavak!**

Vaš hirurški tim

**Impresum:**

Izdavač: NÖ Landesgesundheitsagentur


Verzija 05/2015

Infoblatt Dupuytren'sche Kontraktur

[www.lknoe.at](http://www.lknoe.at)

## Hirurgija

### Informacije o otpustu iz bolnice



**Savjeti za oporavak poslije operacije radi Dupuytrenove kontrakture**

**LANDES**   
**GESUNDHEITS**  
**AGENTUR**

Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.

Savjeti za oporavak poslije operacije radi

### Dupuytrenove kontrakture

**Poštovana pacijentice!**

**Poštovani pacijente!**

Operisani ste radi Dupuytrenove kontrakture.

Dodatno uz naš razgovor o otpustu iz bolnice i ljekarski nalaz želimo Vam ponuditi još nekoliko informacija koje će Vam poslužiti poslije boravka na našem odjeljenju.

Kako biste i Vi najbolje utjecali na proces oporavka, pridržavajte se sljedećeg:

### Poslije otpusta iz bolnice

- Molimo Vas da pripazite da se zavoj ne smoči
- Ne držite ruku duže vrijeme u visećem položaju (držite ruku u visini srca).
- Nemojte da koristite uprtač za ruku (zbog pritiska na vratni pršljen i ukočenosti ramena).
- Po potrebi odredit će se fizikalna terapija (vježbe za prste).

Savjeti za oporavak poslije operacije radi

### Dupuytrenove kontrakture

### Odstranjivanje šavova i njega rane

- Odstranjivanje šavova vrši se 10 do 14 dana poslije operacije.
- Nakon operacije dobit ćete uputnicu za ergoterapiju te Vam preporučujemo da je obavite nužno nakon odstranjivanja šavova.
- Ranu možete njegovati mašću za rane i za zacijeljivanje rana (npr. mast od nevena).
- Preporučujemo da područje rane masirate kružećim pokretima.

Savjeti za oporavak poslije operacije radi

### Dupuytrenove kontrakture

### Općenito

- Blaga sklonost oticanju, gubitak snage, ograničenost u kretanju te blagi poremećaji senzibiliteta operisane šake su normalne pojave prvih sedmica poslije operacije.
- Upravljanje motornim vozilom je zabranjeno sve do dostizanja pune funkcionalnosti šake.