


Nadamo se da smo ovom informacijom odgovorili na Vaša moguća pitanja te Vam želimo brz oporavak.

Vaš ginekološki tim

Ginekologija i akušerstvo

Informacije o otpustu iz bolnice



Savjeti kod oboljenja od mastitisa

Impresum:

Izdavač: NÖ Landesgesundheitsagentur

Verzija 05/2015

Mastitis

www.lknoe.at

Poštovana pacijentice!

Dodatno uz naš razgovor o otpustu iz bolnice i ljekarski nalaz želimo Vam ponuditi još nekoliko informacija koje će Vam poslužiti poslije boravka na našem odjeljenju.

Nastanak i simptomi

Mastitis je izazvan bakterijalnom infekcijom dojke. Uzročnici prodiru preko malih ranica u područje bradavice i šire se uz mlijecne kanale.

Karakteristični simptomi mastitisa su bolovi, crvenilo, osjećaj oticanja u lokalizovanom području dojke. Često se pojavljuje vrućica.

Mastitis se pretežno pojavljuje tokom faze dojenja, ali se ponekad može da pojavi i kod žena koje ne doje.

Terapija

Mastitis se liječi infuzijama antibiotika, lokalnim oblogama koje spriječavaju upalu, oblogama od pavlake i medikamentima za snižavanje vrućice. U pravilu ne morate prestati dojiti.

Izražen mastitis ponekad izaziva stvaranje apscesa. U tim slučajevima je potrebna operacija kako bi se otvorio apsces te iscjedio infekciozni sekret.

Ako je otvaranje apscesa nužno, potrebne su daljne kontrole rane i promjena zavoja nakon otpusta.

Pravila ponašanja

Poslije mastitisa je kod dojenja veoma važno paziti na adekvatnu tehniku prislanjanja, a naše izučene babice i diplomirane medicinske sestre, odn. medicinski tehničari rado će Vas savjetovati.

Značajno je pridati pažnju ranim simptomima koji ukazuju na zastoj mlijeka. I u tom slučaju se posavjetujte sa iskusnom osobom za dojenje: babicom za postporođajnu pomoć i diplomiranim medicinskim sestrama ili medicinskim tehničarima porođajnog odjeljenja.