

Savjeti za ophođenje pri prijetećem pobačaju ■

Savjeti za ophođenje pri prijetećem pobačaju ■

Nadamo se da smo ovom informacijom odgovorili na Vaša moguća pitanja te Vam želimo brz oporavak.

Vaš tim ginekologije i akušerstva

Ginekologija i akušerstvo

Informacije o otpustu iz bolnice



Savjeti za ophođenje pri prijetećem pobačaju

Impresum:
Izdavač: NÖ Landesgesundheitsagentur
Verzija 05/2015
Drohende Fehlgeburt

www.lknoe.at

**LANDES
GESUNDHEITS
AGENTUR**

Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.

Savjeti za ophođenje pri prijetećem pobačaju

Poštovana pacijentice!

Dodatno uz naš razgovor o otpustu iz bolnice i ljeakarski nalaz želimo Vam ponuditi još nekoliko informacija koje će Vam poslužiti poslije boravka na našem odjeljenju.

Savjeti za ophođenje pri prijetećem pobačaju

Simptomi

Predznak za mogući spontani pobačaj su krvarenja, grčevi u donjem dijelu trbuha u ranom stadiju trudnoće i bolovi u području donjeg dijela leđa.

Savjeti za ophođenje pri prijetećem pobačaju

Pravila ponašanja

Poslije otpusta iz bolnice bitno je da izbjegavate fizičko naprezanje. Preporučujemo Vam kratkoročni naknadni pregled kod Vašeg ginekologa/inje. U slučaju da se ponovo pojavi krvarenje i/ili grčevi u trbuhu posjetite bolnicu što prije.