

**Svako ponovno krvarenje je hitni
slučaj!**

Ponovno krvarenje poslije odstranjivanja trećeg krajnika može se pojaviti čak i pri kraju iscjeljivanja rane (u pravilu 2 do 3 sedmice).

Ponovno krvarenje može u principu biti opasno po život, uz krvarenje ili udisaj krvi postoji opasnost od gušenja! Zato se i kod slabog krvarenja Vi, odn. zbog Vašeg djeteta javite hitnoj pomoći (poziv u pomoć 144) kako bi Vas odvezli u obližnje odjeljenje otorinolaringologije.

Tokom transporta važno je sljedeće:

- hladne obloge/ledena kravata oko vrata
- Bočni položaj sa ustima prema dolje, kako bi se lakše ispljuvala krv
- Ne gutajte krv, već je ispljunite!
- Ne unosite hranu ili tečnost i ne uzimajte lijekove!



**Nadamo se da smo ovom informa-
cijom odgovorili na Vaša moguća pi-
tanja te Vam/Vašem djetetu želimo brz
oporavak!**


Vaš tim za otorinolaringologiju



Impresum:
Izdavač: NÖ Landesgesundheitsagentur
Verzija 05/2015
Rachenmandel OP

**Odjeljenje za
otorinolaringologiju**

Informacije o otpustu iz bolnice



**Savjeti za oporavak poslije
odstranjivanja trećeg krajnika
(adenotomija, "odstranjanje
polipa")**

LANDES 
GESUNDHEITS
AGENTUR

Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.

Savjeti za oporavak poslije odstranjenja trećeg krajnika

Poštovana pacijentice!

Poštovani pacijente!

Kod Vas/Vašeg djeteta izvršeno je odstranjivanje krajnika (tzv. "adenoidi" ili "dječji polipi"). Dodatno uz naš informacijski list, razgovor o otpustu iz bolnice i ljekarski nalaz želimo Vam ponuditi još nekoliko informacija koje će Vam poslužiti poslije boravka na našem odjeljenju.

Kako biste i Vi najbolje utjecali na proces oporavka, pridržavajte se sljedećeg:

izbjegavajte fizičko naprezanje 1 sedmicu

izbjegavajte sport, gimnastiku 1 sedmicu

izbjegavajte vruće kupke, plivanje 2 sedmice
i sunčanje

djeca oslobođena vrtića/škole 1 sedmicu

ljekarski pregled nakon 1 sedmice

Savjeti za oporavak poslije odstranjenja trećeg krajnika

Djecu sedmicu dana poslije operacije ne ostavljajte samu, odnosno ih uvijek imajte na oku. Djeca bi noću trebala spavati u blizini roditelja/skrbnika.

Bolovi poslije operacije

Bolovi u području grla rijetko kad se pojavljuju. Lijekovi protiv bolova su samo u rijetkim slučajevima potrebni i koriste se samo uz ljekarevu uputu (povećanje rizika od krvarenja zbog uzimanja lijekova protiv bolova kao npr. Aspirin®!).

Ostalo

Nos može biti začepljen još poslije par dana.

Često dolazi do slabog krvarenja u nosnom sekretu tokom nekoliko dana. Oprezno useknuti nos možete nakon 3 do 4 dana.

Savjeti za oporavak poslije odstranjenja trećeg krajnika

Jela i pića

Do sedmice poslije otpusta izbjegavajte sljedeće:

- vruća, kisela i jako začinjena jela
- citrus voće, voćne sokove, gazirana pića

Tjelesna higijena

Pranje zubi dozvoljeno je nakon prvog dana poslije operacije i sa blagom zubnom pastom (npr. dječjom pastom za zube), jer sa četkicom za zube nećete doseći do rane.

Tuširanje i pranje kose je dozvoljeno, ali samo uz uslov da je voda topla. Ne saginjite glavu prema naprijed. Kupanja u punoj kadi dozvoljena su tek nakon 2 sedmice.