

U slučaju vrućice, jakih bolova u donjem dijelu trbuha ili kod problema pri mokrenju, odmah posjetite ljekara/ku stručne prakse!

Nadamo se da smo ovom informacijom odgovorili na Vaša moguća pitanja te Vam želimo brz oporavak!


Vaš tim urologije

Impresum:
Izdavač : NÖ Landesgesundheitsagentur
Verzija 05/2015
Uro Inkontinenz OP

www.lknoe.at

Urologija

Informacije o otpustu iz bolnice



Savjeti za oporavak poslije operacije inkontinencije

LANDES 
GESUNDHEITS
AGENTUR

Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.

Savjeti za oporavak poslije operacije inkontinencije

Poštovana pacijentice!

Ugrađena Vam je vaginalna traka (takođvana TVT-plastika) koja kod iznenadnog opterećenja dna zdjelice podržava žensku mokraćnu cijev kako mokraća više ne bi nekontrolirano otjecala.

Dodatno uz naš razgovor o otpustu iz bolnice i ljekarski nalaz želimo Vam ponuditi još nekoliko informacija koje će Vam poslužiti poslije boravka na našem odjeljenju.

Kako biste i Vi najbolje utjecali na proces oporavka, pridržavajte se sljedećeg:

Savjeti za oporavak poslije operacije inkontinencije

Izbjegavajte fizičko opterećenje	3-4 Wochen
Nedopušteno dizanje i nošenje tereta (maks. 3-5 kg)	2-3 Wochen
Izbjegavajte polne odnose	4 Wochen
Izbjegavajte kupke u punoj kadi, saune i bazene	6 Wochen
Pregled kod ljekara/ke stručne prakse	4-6 Wochen

Savjeti za oporavak poslije operacije inkontinencije

Opšta pravila ponašanja

- Pripazite da pijete dovoljno tečnosti.
- Smijete jesti i pitи što želite (normalna ishrana), ali izbjegavajte jela i pića koja izazivaju nadutost.
- Pripazite na redovitu (meku) stolicu i na redovito mokrenje.
- Mišići mokraćne cijevi i mjehura prvih sedmica mogu biti nadraženi što se izražava povećanom potrebom za jutarnjim mokrenjem, zajedno sa ispuštanjem kapljica urina. Simptomi nestaju spontano nakon 2 do 3 sedmice.
- Preporučljive su šetnje i kretanje na svježem vazduhu.