


## زنان و زایمان

### اطلاعات منتشر شده

امیدواریم با پاسخ‌های ارائه‌شده در اینجا به تمام  
سؤالات احتمالی شما پاسخ بدهیم و برای شما  
آرزوی بهبودی کامل داریم.

تیم متخصص زنان شما



مراقبت‌های پس از کونیزاسیون  
(مخروط‌برداری)

مشخصات ناشر:

مالک رسانه: NÖ Landesgesundheitsagentur  
Version 03/2018  
Konisation

### قوانین کلی مراقبت

خونریزی یا ترشحات قهوه‌ای رنگ ممکن است 2 تا 3 هفته پس از عمل باقی بمانند.

مدت استراحت پزشکی توسط پزشک خانوادگی شما مشخص می‌شود.

اگر تب، درد شدید شکمی یا خونریزی شدید تجربه می‌کنید، باید به متخصص خود یا بخش زنان و زایمان بیمارستان مراجعه کنید.

برای ایجاد تأثیرات مناسب روی فرآیند بهبود، باید به موارد زیر توجه داشته باشید:

- مراقبت فیزیکی به مدت 2 هفته

تا زمان چکاپ دوباره توسط متخصص:

- پرهیز از رابطه جنسی
- پرهیز از استحمام کامل یا مراجعه به سونا و استخر
- پرهیز از بلند کردن و حمل بارهای سنگین (خطر شروع دوباره خونریزی)
- عدم استفاده از تامپون

چکاپ نزد متخصص پس از 4 تا 6 هفته

### بیمار گرامی!

یک بافت مخروطی شکل از دهانه رحم شما خارج شده است.

علاوه بر بحث‌های مربوط به ترخیص از بیمارستان و نامه پزشک، می‌خواهیم اطلاعاتی برای مراقبت‌های پس از ترک بیمارستان در اختیار شما قرار دهیم.