

Контрольные обследования

Регулярное и частое последующее наблюдение имеет важное значение для длительного успешного функционирования сосудов после реконструкции.

В рамках послеоперационного ухода мы рекомендуем регулярно проходить клинические осмотры, а также ультразвуковые исследования. Пожалуйста, ради Вашей же пользы соблюдайте график амбулаторных обследований.

В случае повышения температуры (более 38 °C), появления припухлостей, боли или покраснений в области раны незамедлительно обратитесь к врачу или в наше амбулаторное отделение.

Мы надеемся, что данная информация содержит ответы на все интересующие Вас вопросы, и желаем Вам скорейшего выздоровления!

Ваша команда хирургического
отделения

Выходные данные:
Владелец издания NÖ Landesgesundheitsagentur
Редакция 05/2015
Arterielle Gefäßoperation

www.lknoe.at

Хирургическое отделение Информация на выписку



Образ жизни после операции
на артериальных сосудах

Уважаемая пациентка!

Уважаемый пациент!

Помимо консультации при выписке и врачебного заключения, по завершении Вашего пребывания в нашем отделении мы хотели бы предоставить Вам некоторую дополнительную информацию.

Уход за телом

Принимать душ можно на 2-й день после операции, однако область раны следует очищать чистой водой без мыла. Пожалуйста, обсудите со своим лечащим врачом возможность применения пластыря для душа. Принимать общую ванну можно не ранее чем через неделю после снятия швов.

Подвергать область операционной раны воздействию солнечных лучей или излучению в солярии можно не ранее чем через 6 месяцев после операции. Принимая солнечные ванны до истечения данного срока, накрывайте рану тканью.

Рубец в целом не требует какого-либо специального ухода, однако для оптимизации процесса заживления можно регулярно наносить на него крем для ухода за кожей.

Раневая боль

В области операционной раны может возникать боль, но при нормальном течении процесса заживления она дает о себе знать не дольше одной недели.

Если боль сохраняется в течение более длительного срока или возобновляется, обратитесь к своему семейному врачу или в наше амбулаторное отделение.

Опухание прооперированной конечности

Припухлость мягких тканей после операции на сосудах связана с нарушением лимфооттока и может сохраняться в течение нескольких месяцев. Обычно припухлость постепенно проходит сама.

Если опухание мягких тканей не проходит или не уменьшается, обратитесь в наше амбулаторное отделение.

Физические нагрузки/ работоспособность

Легкие физические нагрузки допускаются сразу после выписки в зависимости от общего самочувствия. Интенсивные физические нагрузки допускаются не ранее чем через 8–12 недель после операции.

Работоспособность зависит от индивидуальных обстоятельств и профессиональной деятельности.

Прием медицинских препаратов

Для улучшения кровообращения при выписке Вам, в зависимости от особенностей операции на сосудах, будет прописан антитромботический препарат. Пожалуйста, регулярно принимайте данный препарат в течение неограниченного срока. В случае возникновения побочных эффектов незамедлительно обратитесь к своему лечащему врачу или в наше амбулаторное отделение.