

Поведение в случае преждевременного
начала родовой деятельности


Поведение в случае преждевременного
начала родовой деятельности

Мы надеемся, что данная информация содержит ответы на все интересующие Вас вопросы, и желаем Вам спокойной беременности.

Ваша команда отделения
акушерства и гинекологии

Отделение акушерства и гинекологии

Информация на выписку



**Поведение в случае
преждевременного начала
родовой деятельности**

Выходные данные:

Владелец издания: NÖ Landesgesundheitsagentur
Редакция 05/2015
Vorzeitige Wehentätigkeit

www.lknoe.at

**LANDES
GESUNDHEITS
AGENTUR**

Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.

Поведение в случае преждевременного начала родовой деятельности

Уважаемая пациентка!

Помимо консультации при выписке и врачебного заключения, по завершении Вашего пребывания в нашем отделении мы хотели бы предоставить Вам некоторую дополнительную информацию.

Поведение в случае преждевременного начала родовой деятельности

Возникновение и симптомы

Причиной преждевременного начала родовой деятельности является повышенная готовность матки к сокращениям до 34-й недели беременности.

Симптомы преждевременного начала родовой деятельности:

- сокращения матки
- тянущие боли в спине
- в некоторых случаях обильные влагалищные выделения.

Поведение в случае преждевременного начала родовой деятельности

Правила поведения

После выписки из стационара мы рекомендуем в дальнейшем ограничивать физические нагрузки. Мы также рекомендуем Вам пройти срочный контрольный осмотр у своего лечащего врача. В случае систематических болей или кровотечений Вам следует снова обратиться в больницу.