В случае повышения температуры (выше 38 °C), появления покраснений или сыпи в области, где была проведена операция, незамедлительно обратитесь к врачу или в наше амбулаторное отделение.


Мы надеемся, что данная информация содержит ответы на все интересующие Вас вопросы, и желаем Вам скорейшего выздоровления!

Ваша лечащая команда

Выходные данные:

Владелец издания: NÖ Landesgesundheitsagentur Редакция 10/2017 Knie-Arthroskopie

Информация на выписку



Образ жизни после артроскопической операции на коленном суставе или крестовидной связке



www.lknoe.at

Образ жизни после артроскопической операции на коленном суставе или крестовидной связке

Образ жизни после артроскопической операции на коленном суставе или крестовидной связке

Уважаемая пациентка!

Уважаемый пациент!

Помимо консультации при выписке и врачебного заключения, по завершении Вашего пребывания в нашем отделении мы хотели бы предоставить Вам некоторую дополнительную информацию. Послеоперационный период столь же важен, как и сама операция, поэтому примите во внимание следующее:

- В особенности в первую неделю после операции не держите прооперированную ногу опущенной вниз в течение более чем 15 минут без перерыва. Во избежание сильного опухания коленного сустава несколько раз в день укладывайте ногу на возвышение.
- В целом сустав может несколько отекать, также возможен выпот сустава. Как показывает наш опыт, отек и выпот сустава в большинстве случаев проходят сами по себе. При этом положительный эффект могут дать холодные или ледяные обертывания несколько раз в день. Однако в некоторых случаях возникает необходимость в пункции.

- До возобновления полной нагрузки на прооперированную ногу и по предписанию врача для предотвращения тромбоза Вам на протяжении как минимум 4 недель один раз в день требуются подкожные инъекции низкомолекулярного гепарина (например, Lovenox®, Fragmin®). Вы можете делать их сами или обратиться к кому-то из родственников.
- Для разгрузки прооперированной ноги до следующего амбулаторного осмотра используйте 2 костыля с упором на предплечье. Ваш лечаший врач Bac проконсультирует относительно интенсивности допустимых нагрузок в дальнейшем. соблюдайте строго полученные рекомендации.
- Во время пребывания в стационаре Вы лечебно-гимнастические выучили Вы упражнения, которые должны продолжать и после выписки (информацию о длительности тренировок Вы получите в нашем отделении физиотерапии). Упражнения направлены на повышение силы и подвижности и способствуют устранению отека коленного сустава.

Некоторые упражнения также можно выполнять самостоятельно – это повысит эффективность операции.

- До назначенного Вам контрольного амбулаторного осмотра носите фиксирующую шину, которую Вам мог предписать врач. Используйте предписанную шину непрерывного пассивного согласно движения рекомендациям несколько раз в день.
- Прописанные врачом обезболивающие средства следует принимать для снятия отека в случае возникновения значительных затруднений.
- Швы снимают примерно через 10 дней в ходе первого контрольного осмотра.
- Душ можно принимать в любое время, однако используйте при этом пластырь для душа или водонепроницаемую повязку (продается в аптеках). В течение примерно 14 дней после операции не рекомендуется принимать общую ванну.