

Bir boyun řah damarı/karotis ameliyatından sonra yapılacaklar

Bir boyun řah damarı/karotis ameliyatından sonra yapılacaklar

Kontrol amaçlı muayeneler

Yatılı tedavi sırasında bir ultrason incelemesi yapılır. Ameliyattan yakl. 3 ay sonra yine bir ultrason incelemesi yapılmalıdır. Daha sonra radyoloji uzmanı tarafından yıllık kontroller yapılmasını öneriyoruz.

Ateşlenme (38°C'nin üzerinde), yarada şişlik, ağrı ve kızarıklık oluşumunda hemen bir doktora veya ayakta tedavi merkezimize gelmelisiniz.

Verdiğimiz bu bilgilerle bütün sorularınızı cevaplamış olmayı umar size acil şifalar dileriz


Cerrah ekibi

Künye:
Sahibi: NÖ Landesgesundheitsagentur
Baskı 05/2015
Carotis OP

www.lknoe.at

Cerrahi

Taburculuk bilgisi



Bir boyun řah damarı/karotis ameliyatından sonra yapılacaklar

**LANDES
GESUNDHEITS
AGENTUR**

Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.

Değerli Bayan hasta!

Değerli Bay hasta!

Taburcu edilirken yaptığımız görüşmeye ve doktor raporuna ek olarak servisimizde yattığınız dönemle ilgili olarak size birkaç bilgi daha vermek istiyoruz.

Yarada ağrı

Ameliyat yarasında ağrı duyabilirsiniz, ancak bu normalde bir hafta içinde yok olur.

Eğer ağrılar devam ederse ya da yeniden oluşursa lütfen aile doktorunuzla ya da ayakta tedavi merkezimizdeki doktorla görüşün.

Yara bakımı

Prensipte yara için özel bir bakım yapmaya gerek yoktur. Ancak iyileşme sürecini optimize edebilmek için düzenli olarak bir cilt bakım kremi sürülebilir.

Vücut bakımı

Ameliyattan sonraki 2. günden itibaren istediğiniz zaman duş alabilirsiniz, ancak yara bölgesi sabunla değil sadece suyla yıkanmalıdır. Duş için özel bir yara bandı kullanıp kullanmayacağınızı lütfen tedavinizi yapan doktorla konuşun. Banyo yapmak içinse dikişler çıkarıldıktan sonra en az 2 hafta daha beklenmelidir.

Ameliyat bölgesinde güneş banyosu ve solaryum için ise ameliyattan sonra 6 ay beklenmelidir. Daha erken güneş banyosu yapılacaksa yaranın üzeri bir bezle kapatılmalıdır.

Fiziksel yüklenme/çalışabilirlik

Ameliyattan sonra 2 hafta boyunca vücudunuzu korumanızı ve ameliyattan sonra 4 hafta boyunca da ağır fiziksel yüklenmelerden kaçınmanızı öneriyoruz. Bu zamandan sonra artık vücudunuza tamamen yüklenebilirsiniz.

Ameliyattan 2 hafta sonra, ağır fiziksel yüklenmelerin olmadığı bütün spor türlerini yapabilirsiniz.

Çalışabilirlik ise bireye göre değişir ve mesleki faaliyete bağlıdır. Prensipte ameliyattan 2-3 hafta sonra çalışmaya başlayabilirsiniz.

İlaç kullanımı

Kan akışının daha iyi olması için ameliyattan sonra size örn. Thrombo Ass®, Aspirin®, Plavix® vs. gibi trombozit agregasyonlarını önleyen ilaçlar yazılacaktır. Lütfen bu ilacı her gün ve süresiz alın.

Başka bir pıhtılaşmayı önleyen ilaç (örn. Marcoumar®, Sintrom®) alan hastalara bu ilaçlar yazılmaz.