

Kendi güvenliğiniz için lütfen 24 saat boyunca aşağıdaki kurallara uyun:

- Ameliyat günü mümkün olduğunca dinlenmelisiniz.
- Lütfen bir yetişkin tarafından araçla alın, kendi başınıza araç kullanmaktan kaçının, yanınızda refakat eden bir kişi olmadan trafiğe çıkmayın.
- Evde de kendiniz için bakım sağladığınızdan emin olun.
- Evde fiziksel olarak kendinizi yormamalısınız.
- Tehlikeli makineler üstünde veya bu makinelerle çalışmayın.

Önemli: Önerilen ağrı kesicilerle giderilemeyen şiddetli ağrı, uzun süreli bulantı, kusma, ateş (38 °C'nin üzerinde) veya solunum problemleri gibi sorunlar olması halinde derhal bir doktora veya polikliniğimize başvurun.


Ayrıca, buradaki ifadelerin genel tavsiyeler olduğunu belirtmek isteriz. Size özel başka tavsiyelerde bulunulmasını gerektiren bir tıbbi geçmişe sahipseniz, bunlar taburcu görüşmesi sırasında size iletilmiş olacaktır.

Size sağlıklı bir iyileşme dönemi diliyoruz!

Tedavi ekibiniz

Taburcu bilgileri

Brakiyal pleksus anestezi sonrası davranışlar



BASKI BİLGİLERİ
Medya sahibi: NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR
Yayın yeri: 3100 St. Pölten · Fotoğrafın kaynağı: iStock

Versiyon 06/2021

G

A

BRAKİYAL PLEKSUS ANESTEZİSİ SONRASINDAKİ DAVRANIŞLAR


Sayın hasta,

Bu öneriler, brakial pleksus anestezi uygulanmış hastalara yöneliktir.

Brakial pleksus anestezi, brakial pleksusun belirli sinir demetleri (plexus brachialis) uyuşturulur. Brakial pleksus, servikal omurgadan çıkan, köprücük kemiğinin altından, 1. kaburganın üzerinden ve koltuk altından geçerek tüm kolu parmak uçlarına kadar besleyen sinirleri birleştirir. Anestezi verilerek çeşitli noktalardan bloke edilebilir.

Etkilenen bölge sıcak ve hissiz hale gelir, ağrı hissi kesilir ve kol birkaç saat boyunca hareket ettirilemez ya da sadece sınırlı ölçüde hareket ettirilebilir.

BRAKİYAL PLEKSUS ANESTEZİSİ SONRASINDAKİ DAVRANIŞLAR



Pleksus anestezi üst kol, ön kol, el bileği ve parmaklar bölgesindeki müdahaleler için çok uygundur (örneğin karpal tünel sendromu, hızlı parmak, ...).

Olası komplikasyonlar

Nadir durumlarda enjeksiyon, enjeksiyon bölgesinde birkaç gün içinde kaybolacak küçük bir morluğa neden olabilir.

İğne yerleştirilmesi sonucunda sinir yaralanmaları ve lokal enfeksiyonlar son derece nadirdir. Nadiren, cilt sinirlerinin hasar görmesi geçici duyarsızlığa yol açabilir.

BRAKİYAL PLEKSUS ANESTEZİSİ SONRASINDAKİ DAVRANIŞLAR

Ayakta cerrahi sonrası güvenlik kuralları

Günümüzde birçok ameliyat ayakta tedavi bazında gerçekleştirilmektedir. Bu, yalnızca birkaç saat gözetimimizde kalacağınız ve ameliyatın ardından aynı gün taburcu edileceğiniz anlamına gelir. Pleksus anestezi saatlerce sürebildiğinden ve ağrı hissi ve kolun hareketi üzerindeki kontrol azaldığından veya ortadan kalktığından, vücudun anestezi uygulanan kısmında yaralanma riski artar.

- Bu nedenle, sıcak sivri uçlu ve keskin kenarlı nesnelere temastan kaçınınız.
- Uygulanan üçgen bez sizin korunmanız içindir ve sadece ameliyat günü gün boyunca takılmalıdır.
- Pleksus anestezi sonrası, lütfen anestezi uygulanmış vücut bölgelerini dış etkilerden (örn. sıcak, soğuk, basınç) korumaya devam edin.
- İlaçların ve uyuşturucu maddelerin artçı etkileri tepki verme yeteneğinizi geçici olarak etkileyebilir.